



COVID-19

免责声明：本网站持续更新。在所有内容翻译完成之前，其中一些内容可能为英文。

关于COVID-19免疫接种的常见问题解答

2021年4月27日更新

[打印](#)

以下是关于COVID-19免疫接种的常见问题解答。CDC还通过[关于COVID-19疫苗的事实](#)破除常见疫苗误解的信息。

我应如何获得疫苗？

您可以通过多种方式查找免疫接种提供者。您可以访问[VaccineFinder.org](#) 或查看您所在州的卫生部门或当地药房的网站。如需了解更多信息，请访问[我如何获得COVID-19疫苗](#)。

相关页面：

- [如何找到疫苗](#)

关于强生公司的杨森COVID-19疫苗有哪些最新消息？

关于强生公司的杨森COVID-19疫苗有哪些最新消息？

CDC和FDA建议在美国恢复使用强生的杨森COVID-19疫苗，于2021年4月23日生效。但是，50岁以下的女性尤其应该了解免疫接种后的罕见血栓和血小板缺乏症风险，而其他可用COVID-19疫苗还未见出现这个风险。如果您接种了J&J/Janssen疫苗，[点击此处了解须知信息](#)。阅读[CDC/FDA声明](#)。

相关页面：

[CDC建议恢复使用强生公司的杨森COVID-19疫苗 | CDC](#)

我是否可选择接种哪种COVID-19疫苗？

您应在符合条件时接种任何可用的COVID-19疫苗。不要等待特定的品牌。当前获得授权和建议的所有COVID-19疫苗都[安全且有效](#)，CDC对于疫苗没有偏好建议。

进一步了解您的[COVID-19免疫接种](#)，包括如何查找免疫接种地点、预约须知等。

相关页面：

- [您的免疫接种](#)

接种COVID-19疫苗后最常见的副作用是什么？

接种疫苗后，您可能会有一些副作用，这是身体正在建立保护作用的正常表现。常见的副作用包括注射部位的手臂疼痛、发红和肿胀，以及身体其他部位的疲劳、头痛、肌肉疼痛、寒战、发烧和恶心。这些副作用可能会影响您进行日常活动的 ability，但几天后它们就会消失。了解有关[接种COVID-19疫苗后会怎样](#)的更多信息。

相关页面：

- [潜在副作用](#)

如果我怀孕了，是否可以接种COVID-19疫苗？

是的，如果您怀孕了，您可以接种COVID-19疫苗。

您可能希望与您的医疗服务提供者沟通，帮助您决定是否接种疫苗。虽然这种沟通有用，但并非免疫接种前必做行为。进一步了解[孕妇或哺乳女性免疫接种注意事项](#)。

如果您已怀孕且已接种COVID-19疫苗，建议您注册CDC为智能手机开发的[v-safe](#)，该工具可在接种疫苗后提供个性化的健康检查。现已建立[v-safe怀孕登记](#)，以收集有关已接种COVID-19疫苗的孕妇健康状况的信息。

相关页面：

- [孕妇或母乳喂养 | 哺乳人群的COVID-19疫苗](#)
- [孕妇监测系统](#)
- [V-safe怀孕登记](#)

COVID-19疫苗的保护时间持续多久？

我们不知道接受免疫接种的人的保护持续多久。我们知道的是COVID-19已造成很多人患上非常严重的疾病以及死亡。如果您感染了COVID-19，您还可能会将其传播给所爱的人，而他们可能因此重病。接种COVID-19疫苗是更安全的选择。

专家们正致力于进一步了解自然免疫和疫苗诱发的免疫。CDC将在获得更多新证据时通知大众。

相关页面：

- [疫苗发挥作用](#)

如果我已经接种了2剂疫苗，是否还需要佩戴口罩并避免与他人密切接触？

这取决于具体情况。目前已全剂量接种疫苗的人与以下人员可以在室内聚会，且无需保持身体距离或佩戴口罩：

- 其他全剂量接种疫苗的人
- 来自其他同一家庭未接种疫苗的人，除非这些人或任何同住者属于[COVID-19重症高风险人群](#)

在了解更多情况之前，已全剂量接种疫苗的人应继续佩戴口罩，并在其他场合与他人保持6英尺距离，比如在公共场合或探访来自多个家庭未接种疫苗的人时。

有关其他建议，请参阅[全剂量接种疫苗后](#)。

相关页面：

- [全剂量接种疫苗后](#)
- [关键须知](#)
- [保护自己和其他人](#)

如果我感染过COVID-19并且已康复，我还需要接种COVID-19疫苗吗？

是的，无论您是否感染过COVID-19，均应接种疫苗。因为专家们尚不清楚COVID-19康复后，可以保护您多长时间不会再次患病。即使您已经从COVID-19中康复，也有可能再次感染COVID-19致病病毒，尽管这种情况很少见。了解更多关于[为何接种疫苗](#)是比感染病毒更安全的保护方式。

如果您已用单克隆抗体或恢复期血浆治疗过COVID-19，则应等待90天才能接种COVID-19疫苗。如果您不确定所接受的治疗方法，或者对接种COVID-19疫苗还有更多疑问，请咨询您的医生。

专家们仍在进一步了解疫苗在现实环境中防止COVID-19感染的保护时间。一旦有了新的证据，CDC将告知公众。

相关页面：

- [接种疫苗的益处](#)

COVID-19疫苗的成分是什么？

疫苗成分因制造商而异。要了解有关获得授权的COVID-19疫苗的成分的更多信息，请参阅：

- [辉瑞-生物科技COVID-19疫苗相关信息](#)
- [关于莫德纳COVID-19疫苗的信息](#)
- [强生的杨森COVID-19疫苗相关信息](#)

相关页面：

- [辉瑞-生物科技](#)
- [Moderna](#)
- [强生/杨森](#)

谁承担COVID-19疫苗费用？

联邦政府将向居住在美国的所有人免费提供疫苗，无论其移民身份或健康保险状况如何。

COVID-19免疫接种提供者不能：

- 向您收取疫苗费用
- 直接向您收取任何接种费、共付额或共同保险费
- 拒绝为没有医疗保险、保险不足或网络之外的任何人提供免疫接种
- 如果看诊服务仅为COVID-19免疫接种，收取看诊费或其他费用
- 要求额外服务以让某人接种COVID-19疫苗；然而，可以同时提供其他医疗服务并相应收费

COVID-19免疫接种提供者可以：

- 从免疫接种者的保险计划（例如，私人医疗保险、联邦医疗保险、联邦医疗补助）中获得相应疫苗管理费偿付

但是，提供者**不得**向疫苗接种者收取账单费用

- 对于没有医疗保险的疫苗接种者，可以从[卫生资源和服务局的COVID-19无保险计划](#) 中获得偿付

我需要接种多少剂量的COVID-19疫苗？

所需的剂量数取决于您接种的疫苗。为了获得最大保护：

- [辉瑞-生物科技](#)疫苗需要接种两剂，间隔时间应为3周（21天）。
- [莫德纳](#)疫苗需要接种两剂，间隔时间应为1周（28天）。
- [强生杨森 \(J&J/Janssen\)](#) COVID-19疫苗只需接种一剂。

如果您接种的疫苗需要两剂，您应该在**尽量接近推荐间隔的时间内接种第二剂**。但如果需要，**第二剂可以在第一剂后6周（42天）接种**。第二剂接种**不能**早于推荐的间隔时间。

相关页面：

- [辉瑞-生物科技](#)
- [Moderna](#)
- [强生/杨森](#)

如果我患有基础疾病，是否可接种COVID-19疫苗？

患有基础疾病的人可以接种COVID-19疫苗，只要他们对COVID-19疫苗或疫苗中的任何成分没有**直接或严重的过敏反应**。了解关于[基础疾病患者疫苗接种注意事项](#)的更多信息。免疫接种对于患有**某些基础疾病**的任何年龄成年人都是重点考虑事项，因为他们属于COVID-19重症高风险人群。

相关页面：

- [基础疾病](#)
- [高风险人群](#)
- [过敏人群](#)

我现症感染COVID-19时能否接受COVID-19免疫接种？

不行。存在COVID-19症状的人应等到疾病康复且满足结束隔离**标准**之后接种疫苗；没有症状的人也应等到**满足标准**后再接种疫苗。本指导方针也适用于在接种第二剂疫苗前感染COVID-19的人。

相关页面：

- [何时应该检疫隔离](#)
- [结束居家隔离](#)

有关以下方面的更多常见问题解答：

- [医疗人员和COVID-19疫苗](#)
- [VaccineFinder](#)

- [疫苗接种管理系统 \(VAMS\)](#)
- [长期护理机构中的COVID-19免疫接种](#)
- [疫苗接种后的V-safe健康检查程序](#)

2021年4月27日最后更新