


GIYA SA RSV

Enero 2024



Mga sintomas

Ang mga tawo adunay respiratory syncytial virus (RSV) kasagaran nga magpakita og mga sintomas sulod sa 4-6 ka adlaw human matakdan:


- sip-on
- walay gana mukaon
- ubo
- pag-atsi
- hilanat
- pangapoy

Kini nga mga sintomas kasagaran motungha og usa-usa - dili magdungan. **Sa mga bata nga adunay RSV, ang mga sintomas mao ang pagkairitable, minos ug lihok, ug kalisod sa pagginhawa.**

Paykaylap sa Impeksyon

Mahimong mokaylap ang RSV kung:

- moubo o moatsi ang tawo nga aduna niini
- Mga tinulo sa virus gikan sa ubo o atsi mosulod sa imong mata, ilarong, o baba
- pahalok sa nawong sa usa ka bata nga naay virus
- nakahikap ka og butang nga adunay virus, ug nikupot ka sa imong nawong sa wala pa ka nanghugas sa imong kamot



Mahimong mabuhi ang RSV sulod sa pila ka oras sa gahi nga mga butang, sama sa lamesa ug doorknob. Kasagaran kini nga kadali lang mabuhi sa mga humok nga butang sama sa mga tisyu ug kamot.

Paglikay



Ginarekomenda ang RSV nga bakuna para niini nga mga grupo:

- Ang duha ka bakuna sa RSV (Arexvy sa GSK ug Abrysvo sa P izer) gilisensyahan sa FDA ug girekomenda sa CDC alang sa mga tigulang edad 60+.
- Ang usa ka bakuna sa RSV (Abrysvo sa P izer) gilisensyahan ug girekomenda sa mga mabdos na nanay panahon 32-36 nga semana sa pagmabdos.
- Ang usa ka RSV preventive antibody gi lisensyahan ug girekomenda alang sa mga masuso ug pipila ka gagmayng bata.

Aron dili matakdan sa RSV nga sakit, ang adlaw-adlaw nga paglikay makapamubo sa posibilidad nga mokaylap ang RSV.

- **Pagpuyo sa balay kung adunay sakit**
- **Kanunay nga maghugas og kamot**
- **Taboni ang ubo ug atsi gamit ang tissue o sanina, dili gamit ang kamot**
- **Likayi ang pagkupot sa imong nawong sa imong kamot na walay hugas**
- **Kanunay nga limpyohi ang mga butang nga ginakuptan**

Source: www.cdc.gov/rsv

Resources in Asian, Native Hawaiian, and Pacific Islander languages:
www.aa-nhpihealthresponse.org/resources