

ຂໍ້ມູນວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສະບັບປັບປຸງ (ໄບວາເລນ)

ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້

“ໄບວາເລນ” ແມ່ນຫຍັງ?

ໄບວາເລນແມ່ນວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີສ່ວນປະກອບສອງສ່ວນໄດ້ແກ່: ໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ດັ້ງເດີມໜຶ່ງຢ່າງ ແລະ ສາຍພັນໂອ ໄມຄຣອນໜຶ່ງຢ່າງ. ເຊິ່ງແມ່ນວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນໄດ້ກວ້າງຂວາງຕໍ່ກັບໄວຣັສສອງ ຊະນິດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວຈຳນວນຈັກເຂັມ?

ດຽວນີ້ມັນເປັນພຽງແຕ່ເຂັມດຽວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການທີ່ຈະໄດ້ສັກຢາຫຼາຍເຂັມນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸ ແລະ ຂະພາບຂອງທ່ານ. ຈົ່ງປຶກສານຳທ່ານຫມໍ ຫລືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການສັກຢາເຫລົ່ານີ້

ຄຳແນະນຳຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນ

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນ - 5 ປີ

ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເຂັມເພື່ອໃຫ້ຖືກຕາມອາຍຸ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບອາຍຸ ແລະ ຈຳນວນເຂັມສັກຢາທີ່ເຂົາໄດ້ເຄີຍສັກມາກ່ອນ ຈົ່ງປຶກສານຳທ່ານຫມໍຂອງລູກທ່ານ ກ່ຽວກັບເຮືອງການສັກຢາ ເຫລົ່ານີ້

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 6 - 64 ປີ

ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ປັບປຸງແລ້ວຢ່າງນ້ອຍ ໜຶ່ງເຂັມ, ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການປ້ອງກັນໂຣກໂຄວິດໃນປະຈຸບັນ

ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 65 ປີຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີພາວະ ພູມຄຸ້ມກັນບົກພ່ອງ

- ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີ ອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ປັບປຸງແລ້ວໜຶ່ງເຂັມ ແລະ ເຂັມທີ່ສອງ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.
- ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີ ພາວະພູມຕ້ານທານສຸຂະພາບຕໍ່າ, ທ່ານສາມາດສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ປັບປຸງແລ້ວໜຶ່ງເຂັມ ແລະ ເຂັມທີ່ສອງ 2 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃກ້ທ່ານ:

ຄົ້ນຫາ [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov), ພິມລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານສົ່ງໄປທີ່ 438829 ຫຼື ໂທຫາ 1-800-232-0233.



ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ