

اگست 2024

# اسکول واپسی معمول کے حفاظتی ٹیکے

# میرے بچے کو کون سے ویکسین کی ضرورت ہے؟

● آپ کے بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے عام طور پر ایک حفاظتی ٹیکوں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریاست (اسٹیٹ) بھی اسکول میں داخل ہونے والے بچوں کو مخصوص بیماریوں، جیسا کہ کالی کھانسی (کالی کھانسی) کی ویکسین لگوانے کا تقاضہ کرے۔ کچھ ریاستوں میں یا تو کنڈر گارٹن میں داخلہ لینے کے لیے، اضافی ویکسینز کی ضرورت ہوتی ہے۔

اگر آپ اپنی اسٹیٹ کے اسکول کے حفاظتی ٹیکوں کی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں، تو اپنے بچے کے ڈاکٹر سے، اپنے بچے کے اسکول سے، یا اپنی اسٹیٹ کے شعبۂ صحت سے معلوم کریں۔

### عوام کے لیے تجویز کردہ ویکسینز

- 1. تازہ ترین COVID-19 2025-2024 ویکسین: CDC تجویز کرتا ہے کہ ہر 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے افراد تازہ ترین COVID-19 2024-2025 تجویز کرتا ہے کہ ہر 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے افراد تازہ ترین COVID-19 2024-2025 ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز حاصل کرے۔ نئی ویکسین کی دستیابی موسم خزاں 2024 میں متوقع ہے۔
  - 2. تازہ ترین 2025-2024 انفلوئنزا (نزلہ) کی ویکسین: CDC تجویز کرتا ہے کہ بچوں کو نزلے کی ویکسین ہر سال لگنی چاہیے۔ کچھ بچے جن کی عمر 6 ماہ 8 سال ہے وہ ایک سال میں 2 ڈوزز لگوانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ تازہ ترین فارمولہ 25-2024 کے نزلے کے موسم میں دستیاب ہو گا۔
    - کیا میرا بچہ بیک وقت اپنی نزلے کی شاٹ اور COVID-19 کی ویکسین بحفاظت لے سکتا ہے؟

جی ہاں، اگر آپ اہل ہیں تو بیک وقت نزلے کی ویکسین اور COVID-19 کی ویکسین لگوانے کی تجویز دی گئی ہے اور ہر ویکسین لگوانے کا وقت مناسب ہے۔ اگرچہ نزلے کی ویکسین لگوانے کی تجویز ستمبر/اکتوبر میں دی گئی ہے، مگر جولائی یا اگست میں ویکسین لگوانا ان بچوں کے لیے مناسب سمجھا جاتا ہے جنہوں نے ان مہینوں میں طبی نگہداشت کے لیے جانا ہو بالفرض اگر انہیں ویکسین لگوانے کا کوئی دوسرا موقع نہ مل سکے۔

سائنسی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی دورے میں دونوں ویکسینز لگوانا محفوظ ہے۔ ایک CDC مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نزلے کی ویکسین اور ایک خوراک پر مشتمل COVID-19 کی ویکسین لگوائی ان میں ردعمل ہونے کا امکان زیادہ ہے بہ نسبت ان افراد کے جنہوں نے صرف ایک خوراک پر مشتمل COVID-19 کی ویکسین لگوائی ہو۔ ردعمل میں تھکاوٹ، سر درد، اور اعصاب کا درد شامل ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ہلکی نوعیت کے تھے اور جلد دور ہو گئے۔




### مزید جاننا چاہتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس QR کوڈ کو اسکین کریں کہ آپ کے بچے کو کونسی ویکسینز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یا درج نیل ملاحظہ کریں www.cdc.gov/vaccines/tool/child.html

# آپ کے بچے کو عمر بڑھنے کے ساتھ ویکسینز کی ضرورت ہوتی ہے! پیدائش سے لے کر 6 سال کی عمر تک 2024 کے تجویز کردہ حفاظتی ٹیکے



### اہم بات

- اس عمر تک تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگ جانے چاہئیں۔
- کچھ بچوں کو ویکسین کی یہ خوراک یا اس عمر میں انسدادی اینٹی باڈی لینی چاہیئے



- 1. آپ کے بچے کی ایسی کوئی طبی حالت ہے کہ جو اس کو متعدی مرض لاحق ہونے کے بہت زیادہ خطرے میں مبتلا کر سکتی ہے۔
  - 2. آپ کا بچہ امریکہ سے باہر سفر کر رہا ہے۔
  - 3. آپ کے بچے سے ایک ایسی ویکسین چھوٹ جاتی ہے جو ان کی عمر کے لیے تجویز کی گئی ہو۔







### مزید جاننا چاہتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس QR کوڈ کو اسکین کریں کہ آپ کے بچے کو کونسی ویکسینز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یا درج ذیل ملاحظہ کریں www.cdc.gov/vaccines/tool/child.html

# بڑے بچوں اور نوجوانوں کو بھی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے! 7-18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تجویز کردہ 2024 کے حفاظتی ٹیکے



ابر حمل کے دوران Tdap کی ایک خوراک تجویز کی گئی ہے

ڈینگی

اس عمر کے تمام بچوں کو ویکسین لگنی چاہیئے۔

اس عمر کے تمام بچے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔



اس عمر کے کچھ بچوں کو ویکسین لگوانی چاہیئے

والدین/دیکھ بھال کرنے والوں کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے صحت کے نگیداشت فراہم کنا، میں بات کرنی چاہیئے کہ آیا ویکسین ان کے بچے کے لیے ٹھیک ہے

اگر درج ذیل صورتحال ہو تو مزید ہدایات کے لیے اپنے بچے کی صحت کے نگہداشت فراہم کنندہ سے بات کریں:

1. آپ کے بچے کی کوئی ایسی طبی حالت ہے جو انہیں متعدی مرض لاحق ہونے کے شدید خطرے سے دوچار کرتی ہے یا وہ حاملہ ہے۔

2. آپ کا بچہ امریکہ سے باہر سفر کر رہا ہے۔

صرف اس صورت میں اگر ایسی جگہ رہانش پذیر ہیں جہاں ڈینگی عام ہے اور ماضی میں ڈینگی کے متعدی مرض کی تصدیق کرنے والا لیبارٹری کا ٹیسٹ آ چکا ہے

3. آپ کے بچے کی ان کی عمر کے لیے یا بچوں اور نوجوان بچوں کے لیے تجویز کردہ کوئی ویکسین چھوٹ جاتی ہے۔



