

العودة إلى المدرسة اللقاحات الروتينية

ما هي اللقاحات التي يحتاجها طفلي؟

- إن طفلك عادةً سيحتاج شهادة لقاحات ليسجل بالمدرسة. قد تطلب ولايتك أيضًا تطعيم الأطفال الذين سيلتحقون بالمدرسة ضد أمراض معينة، مثل السعال الديكي. تطلب بعض الولايات لقاحات إضافية، إما للالتحاق برياض الأطفال أو الصفوف التي تليها. إذا لم تكن متأكدًا من متطلبات التطعيم بالمدارس التابعة لولايتك، يُرجى الرجوع إلى طبيب طفلك، أو مدرسته، أو وزارة الصحة التابعة لولايتك.

اللقاحات الموصى بها في جميع القطاعات

- 1. اللقاح المحدث ضد فيروس كورونا المستجد لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥: يوصي مركز مكافحة الأمراض بأن يتلقى كل شخص يبلغ من العمر ٦ أشهر وما فوق جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المحدث ضد فيروس كورونا المستجد لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥. ومن المتوقع أن يتوفر اللقاح الجديد في خريف ٢٠٢٤.
- 2. اللقاح المحدث ضد الإنفلونزا لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥: يوصي مركز مكافحة الأمراض بأن يأخذ الأطفال لقاح الإنفلونزا سنويًا. بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و ٨ سنوات يستوفون شروط الحصول على جرعتين في السنة. ومن المقرر أن تتوفر هذه النسخة المحدثّة في فترة الإصابة بالإنفلونزا في عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

هل يمكن لطفلي أن يأخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح فيروس كورونا المستجد بأمان في نفس الوقت؟

نعم، يُنصح بالحصول على لقاح الإنفلونزا ولقاح فيروس كورونا المستجد في الوقت نفسه إذا كنت مؤهلاً وكان توقيت كل لقاح مناسبًا. يُوصى بالتطعيم ضد الإنفلونزا في شهر أيلول/تشرين الأول، إلا أنه يمكن التفكير في التطعيم في شهر تموز أو آب للأطفال الذين يتلقون زيارات رعاية صحية خلال تلك الأشهر إذا لم تكن هناك فرصة أخرى لتطعيمهم.

أظهرت الدراسات أنه من الأمان الحصول على اللقاحين في نفس الزيارة. أظهرت إحدى دراسات مراكز مكافحة الأمراض أن الأشخاص الذين أخذوا لقاح الإنفلونزا ولقاح فيروس كورونا المستجد أحادي التكافؤ كانوا أكثر عرضة قليلاً لردود الفعل تجاهه من الأشخاص الذين لم يحصلوا على سوى لقاح فيروس كورونا المستجد أحادي التكافؤ. شملت الأعراض التعب والصداع وآلام العضلات، لكنها كانت في الغالب خفيفة وتختفي بسرعة.



هل ترغب في معرفة المزيد؟
يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة المبين
لمعرفة التطعيمات التي يحتاجها طفلك. أو زيارة
www.cdc.gov/vaccines/tool/child.html

يحتاج طفلك في مراحل نموه إلى اللقاحات!

٢٠٢٤ اللقاحات الموصى بها منذ الولادة وحتى عمر ٦ سنوات

| ٦-٤ سنوات | ٣-٢ سنوات | ٢٣-٢٠ أشهر | ١٩ أشهر | ١٨ أشهر | ١٥ أشهر | ١٢ أشهر | ٨ أشهر | ٧ أشهر | ٦ أشهر | ٤ أشهر | ٢ شهرين | ١ شهر | عند الولادة | اللقاح أو الأجسام المضادة الوقائية |
|---|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|--|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | يعتمد على حالة الطفل الصحية | | | | يعتمد على حالة تطعيم الأم ضد الفيروس المخلوي التنفسي | | | | | | | الجسم المضاد الوقائي المضاد للفيروس المخلوي التنفسي |
| | | | | الجرعة الثالثة | | | | | | | | الجرعة الثانية | الجرعة الأولى | إلتهاب الكبد الوبائي بي |
| | | | | | | | | | الجرعة الثالثة | الجرعة الثانية | الجرعة الأولى | | | الفيروس العجلي |
| الجرعة الخامسة | | | | الجرعة الرابعة | | | | | الجرعة الثالثة | الجرعة الثانية | الجرعة الأولى | | | اللقاح الثلاثي (الكزاز- الخناق-السعال الديكي) |
| | | | | | الجرعة الرابعة | | | | الجرعة الثالثة | الجرعة الثانية | الجرعة الأولى | | | هيموفيلوس انفلونزا |
| | | | | | الجرعة الرابعة | | | | الجرعة الثالثة | الجرعة الثانية | الجرعة الأولى | | | المكورات الرئوية |
| الجرعة الرابعة | | | | الجرعة الثالثة | | | | | | الجرعة الثانية | الجرعة الأولى | | | شلل الأطفال |
| جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المحدث ضد فيروس كورونا المستجد (تركيبة ٢٠٢٤-٢٠٢٥). | | | | | | | | | | | | | | |
| سنويًا جرعتين لبعض الأطفال | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | الجرعة الأولى | | | | | | | | | الحمص، النكاف، الحصبة الألمانية |
| | | | | | الجرعة الأولى | | | | | | | | | جدري الماء |
| | | جرعتين بينهما 6 أشهر | | | | | | | | | | | | إلتهاب الكبد الوبائي أ |

لمزيد من التوجيه، يمكنك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك في الحالات الآتية:

1. إذا كان طفلك يعاني من أي حالة صحية تجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
2. إذا كان طفلك يسافر خارج الولايات المتحدة.
3. إذا فوت طفلك اللقاح الموصى به لمن عمره.

مفتاح الألوان

ينبغي لجميع الأطفال أن يحصلوا على التطعيم في هذا العمر.

ينبغي لبعض الأطفال أن يحصلوا على هذه الجرعة من اللقاح أو الجسم المضاد الوقائي في هذا العمر.



هل ترغب في معرفة المزيد؟
يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة المبين
لمعرفة التطعيمات التي يحتاجها طفلك. أو زيارة
www.cdc.gov/vaccines/tool/child.html

يحتاج الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين إلى اللقاحات أيضًا!

٢٠٢٤ اللقاحات الموصى بها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٧ و ١٨ سنة

| التطعيمات الموصى بها | ٧ سنوات | ٨ سنوات | ٩ سنوات | ١٠ سنوات | ١١ سنة | ١٢ سنوات | ١٣ سنوات | ١٤ سنة | ١٥ سنة | ١٦ سنة | ١٧ سنة | ١٨ سنة |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|
| فيروس الورم الحليمي البشري | | | | | | ● | | | | | | |
| الخنثاق والشاهوق والسعال الديكي 1 | | | | | | ● | | | | | | |
| المكورات السحائية | | | | | | ● | | | | ● | | |
| المكورات السحائية المجموعة ب | | | | | | | | | ● | | | |
| الإنفلونزا | | | | | | | ● سنويًا جرعتين لبعض الأطفال | | | | | |
| فيروس كورونا المستجد | | | | | | | | | ● جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المحدث ضد فيروس كورونا المستجد (تركيبية ٢٠٢٤-٢٠٢٥). | | | |
| الفيروس المخلوي التنفسي | | | | | | | | | ● في حالة الحمل أثناء فترة الفيروس المخلوي التنفسي | | | |
| جدري القردة | | | | | | | | | | | ● | |
| حمى الضنك | | | | | | | | | ● فقط في حالة العيش في منطقة ينتشر فيها حمى الضنك وحال الحصول على اختبار معلمي يؤكد إصابة مسبقًا بحمى الضنك | | | |

يُوصى بجرعة واحدة من لقاح الخنثاق والشاهوق والسعال الديكي خلال كل فترة حمل

مفتاح الألوان

- ينبغي لجميع الأطفال في هذه الفئة العمرية الحصول على اللقاح.
- يمكن لجميع الأطفال في هذه الفئة العمرية الحصول على اللقاح.
- ينبغي لبعض الأطفال في هذه الفئة العمرية الحصول على اللقاح.
- يجب على الآباء / القائمين بالرعاية التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح مناسبًا لطفليهم.

لمزيد من التوجيه، يمكنك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك في الحالات الآتية:

1. إذا كان طفلك يعاني من أي حالة صحية تجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو في حالة الحمل.
2. إذا كان طفلك يسافر خارج الولايات المتحدة.
3. إذا فوت طفلك أي لقاح موصى به لمن في عمره أو لحديثي الولادة أو للأطفال الصغار.



الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال

حرصًا منا على صحة جميع الأطفال



الأكاديمية الأمريكية لطب الأسرة

لمزيد من المعلومات
يرجى الاتصال على الرقم المجاني: (1-800-232-4636) 1-800-CDC-INFO
أو زيارة: www.cdc.gov/vaccines/parents

وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية
مراكز مكافحة الأمراض
والوقاية منها

