



COVID-19

유의 사항: 이 웹 사이트는 수시로 업데이트됩니다. 일부 내용은 모든 내용이 번역될 때까지 영어로 기재되어 있을 수 있습니다.

COVID-19 예방 접종 관련 자주묻는질문


2021년 4월 27일 업데이트

인쇄

아래에는 COVID-19 백신 접종에 관한 일반적인 질문과 그에 대한 답이 정리되어 있습니다. CDC는 또한 백신에 관한 흔한 헛소문을 타파하는 데 유용한 정보를 [COVID-19 백신 관련 팩트](#)에 정리해 두었습니다.

백신을 어떻게 접종받을 수 있습니까?



여러 곳에서 백신 접종 제공자를 찾을 수 있습니다. [VaccineFinder.org](https://www.vaccinefinder.org)  를 방문하거나 주 보건부 또는 지역 약국 웹사이트를 확인하세요. 자세한 내용은 [COVID-19 백신 접종 방법](#)을 참조하세요.

관련 페이지:

- [백신 접종 정보 확인 방법](#)

존슨앤존슨 얀센 COVID-19 백신에 관한 최신 정보가 있습니까?



존슨앤존슨 얀센 COVID-19 백신에 관한 최신 정보가 있습니까?

CDC와 FDA는 2021년 4월 23일부터 미국에서 존슨앤존슨 얀센(J&J/얀센) COVID-19 백신 사용을 재개하도록 권장했습니다. 그러나 50세 미만 여성은 드물지만 백신 접종 후 혈소판 감소를 동반하는 혈전이 발생할 위험이 있음과, 그러한 위험이 발견된 바 없는 다른 COVID-19 백신이 제공됨을 알고 있어야 합니다. J&J/얀센 백신을 접종한 경우 [여기에서 주의사항을 확인하세요](#). [CDC/FDA 발표문](#)도 확인하세요.

관련 페이지:

[존슨앤존슨 얀센 COVID-19 백신 사용 재개에 관한 CDC 권장 | CDC](#)

COVID-19 백신 종류를 선택할 수 있습니까?



순서가 오면 무엇이든 제공되는 COVID-19 백신을 맞아야 합니다. 특정 제품을 기다리지 마세요. 현재 승인 및 허가받은 모든 COVID-19 백신은 [안전](#)하고 [효과적](#)이며 CDC는 특정 백신을 접종하라고 권장하지 않습니다.

백신 접종 장소 검색 방법, 예약할 때 예상 사항 등 [COVID-19 백신 접종](#)에 대해 자세히 알아보세요.

관련 페이지:

- [백신 접종](#)

COVID-19 백신을 맞은 후 나타나는 가장 일반적인 부작용은 무엇입니까? ▽

백신을 접종하고 나면 신체가 보호 기능을 구축하고 있다는 정상적인 신호인 부작용이 나타날 수 있습니다. 일반적인 부작용은 주사 맞은 팔의 통증, 발적, 부기 그리고 몸살, 두통, 근육통, 오한, 발열, 메스꺼움입니다. 이러한 부작용은 일상 활동에 지장을 주기도 하지만, 며칠 내에 사라질 것입니다. [COVID-19 백신 접종 후 예상사항에 대해 자세히 알아보세요.](#)

관련 페이지:

- [가능한 부작용](#)

임신한 경우 COVID-19 백신을 맞을 수 있습니까? ▽

예, 임신중이라도 COVID-19 백신을 맞을 수 있습니다.

백신 접종 여부를 결정할 때 의료기관과 상담하는 것이 좋습니다. 상담은 도움이 되지만 백신 접종 전에 반드시 해야 하는 것은 아닙니다. [임신부 또는 모유수유부 백신 접종 고려사항에 대해 자세히 알아보세요.](#)

임신 중에 COVID-19 백신을 접종하는 경우에는 백신 접종 후 건강 체크로 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 CDC의 스마트폰 기반 도구인 [v-safe](#)에 등록하는 것이 좋습니다. COVID-19 백신을 접종받은 임신부의 건강 정보를 수집하기 위해 [v-safe 임신부 등록](#)이라는 것이 생겼습니다.

관련 페이지:

- [임신부 또는 모유수유부 COVID-19 백신 접종](#)
- [임신부 모니터링 시스템](#)
- [V-safe 임신부 등록](#)

COVID-19 백신의 보호 기능은 얼마나 오래 지속됩니까? ▽

백신 접종자의 면역력이 얼마나 오래 지속되는지에 대한 정보는 없습니다. 우리가 아는 것은 COVID-19가 많은 사람에게 매우 심각한 질병과 사망을 초래했다는 것입니다. COVID-19에 걸리면 사랑하는 사람이 감염돼 매우 심각하게 아플 수 있습니다. COVID-19 백신을 접종하는 것이 더 안전한 선택입니다.

자연 면역과 백신 유도 면역에 관해 더 많이 알아내기 위해 전문가들이 연구 중입니다. CDC는 새로운 증거가 확보되는 대로 계속해서 일반에 공개할 것입니다.

관련 페이지:

- [백신 효과](#)

백신을 2회분을 모두 접종받은 경우에도 다른 사람과의 밀접 접촉을 피하고 마스크를 착용해야 합니까? ▽

경우에 따라 다릅니다. 현재 백신 접종을 완전 완료한 사람은 물리적 거리두기나 마스크 착용 없이도 다음과 같은 경우에 실내에 모일 수 있습니다.

- 백신 접종을 완료한 다른 사람들과 모임 가능
- 백신을 접종하지 않은 다른 가구의 사람들과 모임 가능(이 사람들 또는 그들의 동거인이 [COVID-19 중증 질환 고위험군](#)이 아닌 경우)

더 많은 정보가 알려질 때까지, 백신 접종을 완료한 사람들은 접종을 받지 않은 여러 가구의 사람들이 있는 공공장소 등 여러 장소에서 계속해서 마스크를 착용하고 6피트 거리두기를 해야 합니다.

추가 권장사항은 [백신 접종을 완전히 완료했을 때](#)에서 확인할 수 있습니다.

관련 페이지:

- [백신 완전 접종의 경우](#)
- [알아야 할 주요 사항](#)
- [자신과 다른 사람을 보호하기](#)

COVID-19에 이미 걸렸다가 회복된 경우에도 COVID-19 백신이 나오면 접종 받아야 하나요? ∨

예, COVID-19 감염력에 관계없이 백신을 접종받아야 합니다. COVID-19에서 회복한 후 면역성이 얼마나 오래 지속되는지 아직 전문가들도 모르기 때문입니다. COVID-19에서 회복된 후 COVID-19 유발 바이러스에 다시 감염된 예가 드물기는 하지만 있습니다. 감염보다 [백신 접종이 더 안전한 면역 형성 방법인 이유](#)에 대해 자세히 알아보세요.

단일 클론 항체 또는 회복기 혈장으로 COVID-19 치료를 받았다면, 90일이 지난 이후에 COVID-19 백신 접종을 받아야 합니다. 어떤 치료를 받았는지 확실하지 않거나 COVID-19 백신 접종에 대해 궁금한 점이 있으면 의사와 상담하세요.

실제 상황에서 백신이 COVID-19로부터 얼마나 오랫동안 보호를 제공하는지에 대해 전문가들이 알아가고 있습니다. CDC는 새로운 증거가 나오는데로 계속해서 정보를 제공할 것입니다.

관련 페이지:

- [백신 접종의 장점](#)

COVID-19 백신은 어떤 성분으로 구성되어 있나요? ∨

백신 성분은 제조업체에 따라 다를 수 있습니다. 승인된 COVID-19 백신 성분에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [화이자-바이오앤텍 COVID-19 백신 관련 정보](#)
- [모더나 COVID-19 백신 관련 정보](#)
- [존슨앤존슨 얀센 COVID-19 백신 관련 정보](#)

관련 페이지:

- [화이자-바이오앤텍](#)
- [모더나](#)
- [존슨앤드존슨/얀센](#)

COVID-19 백신 비용은 누가 부담하니까? ∨

연방정부는 이민 또는 건강보험 상태에 관계없이 미국에 거주하는 모든 사람들에게 백신을 무료로 제공하고 있습니다.

COVID-19 백신 접종 제공업체에 대해 다음을 **금지**합니다.

- 접종자에게 백신 비용 청구
- 투여 수수료, 본인부담금, 공동보험 명목의 직접 청구

- 보험이 없거나 보험 혜택이 충분하지 않거나 네트워크에 속하지 않다는 이유로 백신 접종 거부
- COVID-19 백신 접종이 제공된 유일한 서비스인 경우, 진료 대상자에게 진료실 방문료 또는 기타 요금 청구
- COVID-19 백신 투약의 조건으로 추가 서비스 요구. 그러나 추가 의료 서비스를 동시에 제공하고 그에 대한 비용을 적절하게 청구할 수는 있습니다.

COVID-19 백신 제공자는 다음을 할 수 있습니다.

- 환자의 플랜 또는 프로그램(예: 민영건강보험, 메디케어, 메디케이드)에 백신 투약 비용의 환급 요청
 - 그러나 백신 제공자는 백신 피접종자에게 청구서 잔액을 청구할 수 없습니다.
- 보험 미가입 백신 피접종자에 대한 환급비를 보건자원 및 서비스국(HRSA)의 COVID-19 보험 미가입자 프로그램 [☞](#) 에 요청할 수 있습니다.

COVID-19 백신을 몇 번 접종 받아야 합니까? ▽

접종 횟수는 어느 백신을 맞는지에 따라 다릅니다. 최고 면역력을 갖추려면:

- 화이자-바이오엔텍 백신은 3주(21일) 간격으로 2회 접종해야 합니다.
- 모더나 백신은 1개월(28일) 간격으로 2회 접종해야 합니다.
- 존슨앤존슨 얀센(J&J/얀센) COVID-19 백신은 1회 접종만 필요합니다.

2회 접종이 필요한 백신을 맞으면 **가급적 권장 간격에 맞추어 2차 접종을 맞아야 합니다.** 그러나 필요하다면 1차 접종후 최대 **6주(42일)까지는 2차 접종을 받을 수 있습니다.** 권장 간격보다 빨리 2차 접종을 받지는 **않아야** 합니다.

관련 페이지:

- 화이자-바이오엔텍
- 모더나
- 존슨앤드존슨/얀센

기저질환이 있는 경우 COVID-19 백신 접종을 받을 수 있습니까? ▽

기저질환이 있는 사람은 COVID-19 백신 또는 백신의 모든 성분에 대해 **즉각적 또는 중증 알레르기 반응**이 없는 한, COVID-19 백신을 맞을 수 있습니다. **기저질환자 백신 접종 고려사항**에 대해 자세히 알아보세요. 백신 접종은 **특정 기저질환**이 있는 모든 연령대 성인에게 중요한 고려사항입니다. COVID-19로 인한 중증 질환 위험이 높기 때문입니다.

관련 페이지:

- 기저질환
- 고위험군
- 알레르기가 있는 사람들

현재 COVID-19에 걸린 상태에서 COVID-19 백신 접종을 받을 수 있습니까? ▽

아니요. 증상이 있는 COVID-19 감염자는 질병에서 회복되고 격리 해제 **기준**을 충족할 때까지 백신 접종을 연기해야 합니다. 무증상 감염자도 **기준을 충족할 때까지** 기다린 후 백신 접종을 받아야 합니다. 이 지침은 2차 백신 접종을 받기 전에 COVID-19에 걸리는 사람에게도 적용됩니다.

관련 페이지:

- 검역격리가 필요한 경우
 - 자택격리 해제
-

질문과 답변 더보기

- 의료 전문가와 COVID-19 백신
- 백신검색기
- 백신 처방 관리 시스템(VAMS)
- 장기요양시설에서의 COVID-19 예방 접종
- V-safe, 예방 접종 후 건강 검사기

최종 업데이트 2021년 4월 27일