


Japanese
2022 年 6 月

最新情報をご覧ください

新型コロナウイルス 感染症ワクチンの ブースター接種 ガイドンス



新型コロナウイルス感染症ワクチンのブースター接種に関する最新のガイドラインについて質問がある場合、この資料で最新情報をお読みいただければ、ご自身やご家族、コミュニティを守ることができます。

新型コロナウイルス感染症ワクチンのブースター接種は、安全を確保できる期間を延長し、重度の病気や死亡を防止します。

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

出典：米国疾病管理予防センター（CDC）



最新情報をご覧ください

Japanese
2022 年 6 月

新型コロナウイルス感染症ワクチンのブースター接種ガイドンス

1 回のブースター接種ができます 2 回のブースター接種ができます

- 一次ワクチンの接種を受けた 5 歳以上の方

- 一次ワクチンの接種を受けた 50 歳以上の方
- J&J 製ワクチンの一次ワクチンとブースター接種を受けた 18 歳以上の方
- 中等度または重度の免疫不全症の患者であり、一次ワクチンの接種を受けた 12 歳以上の方




Japanese
2022 年 6 月

最新情報をご覧ください

5～11 歳のお子さま

5～11 歳のお子さまは、ファイザー・バイオンテック製の一次ワクチンを接種してから **5 カ月**後にブースター接種を受ける必要があります。お子さまが免疫不全の場合は、一次接種の **3 カ月**後にブースター接種を受ける必要があります。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM




Japanese
2022 年 6 月

最新情報をご覧ください

12 歳以上の方

12 歳以上のすべての方は、ファイザーまたはモデルナ製の一次接種を終えてから **5 ヶ月** 後、あるいはジョンソン・エンド・ジョンソン (J&J) 製ワクチンを投与した **2 ヶ月** 後にブースター接種を受ける必要があります。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



Japanese
2022 年 6 月

最新情報をご覧ください

12 歳以上の 免疫不全患者の方

中等度または重度の免疫不全患者で 12 歳以上の方は、
最初のブースター接種を受けてから **4 カ月**後に
2 回目のブースター接種を受ける必要があります。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



Japanese
2022 年 6 月

最新情報をご覧ください

50 歳以上の方

50 歳以上の方は、最初のブースター接種を受けてから **5 カ月**後に 2 回目のブースター接種を受ける必要があります。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



Japanese
2022 年 6 月

最新情報をご覧ください

18 歳以上で、J&J 製ワクチンの接種を受けた方

J&J 製ワクチンの一次ワクチンとブースター接種を受けて **4 カ月**経った 18 歳以上の方は、mRNA 新型コロナウイルスワクチンの二次ブースター接種を受けることができます。



最新情報をご覧ください

Japanese
2022 年 6 月

新型コロナウイルス 感染症のリソース

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の予約をスケジュールするには、vaccines.gov にアクセスするか、[1-800-232-0233](tel:1-800-232-0233) に電話するか、あるいはご自分の郵便番号を [438829](tel:438829) にテキスト送信してください。また、地域の医師、地域社会に拠点を置く組織、Federally Qualified Health Center、Rural Health Clinic、または Native Hawaiian Health Center に連絡して、さらに支援を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症の詳細については、apiahf.org をご覧いただくか、covid@apiahf.org まで電子メールでお問い合わせください。

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

この公表文献は、米国保健福祉省（HHS）の疾病管理予防センターからの協力協定、CDC-RFA-IP21-2106 によって作成されました。
その内容に関する責任は著者のみにあり、必ずしも CDC/HHS の公式見解を示すものではありません。