


# COVID-19 疫苗加强针常见问题

有关COVID-19疫苗加强针的常见疑问和解答



**APIAHF**  
ASIAN & PACIFIC ISLANDER  
AMERICAN HEALTH FORUM

**WE  
CAN  
DO  
THIS**  
COVID-19  
Community Corps

**cpacs**  
center for pan asian community services

## 哪些人适宜接种加强针？

所有满12周岁并完成以下疫苗接种的人士：

- 完成辉瑞（Pfizer）疫苗初始系列的第二剂接种且满5个月以后，建议接种加强针。

所有满18周岁并完成以下疫苗接种的人士：

- 完成莫德纳（Moderna）疫苗初始系列的第二剂接种且满5个月以后，建议接种加强针。
- 完成强生（Johnson & Johnson）疫苗接种且满2个月以后，建议接种加强针。

经历突破性感染（即完全接种疫苗后仍检验出COVID-19阳性）的病人同样建议接种加强针，因为已有研究证明疫苗的免疫效果比自然免疫更持久。

## 为什么有必要接种加强针？

所有疫苗的效果已经得到证实。疫苗可以有效防止感染并显著降低由COVID-19导致住院治疗以及死亡的概率。疫苗的保护作用会随时间推移而降低，因此接种加强针很有必要。这种情况在其他常规疫苗中也经常出现，例如破伤风，百日咳和白喉（Tdap）疫苗。加强针可以在长时间内最大程度上起到保护作用。



# 什么是「初始系列」？「附加针」和「加强针」有什么不同？

「初始系列」是指预防病毒所需的两剂辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）疫苗，或一剂强生（Johnson & Johnson）疫苗。对于免疫功能极度缺失的人群，建议在接种完疫苗初始系列后28天，再接种一次辉瑞或莫德纳疫苗的「附加针」，因为这部分人需要额外接种一剂疫苗，才能产生和正常人相同程度的免疫力。「加强针」是在接种完初始系列后，因为免疫力会随时间而降低，为了增强保护作用而补充的一剂疫苗。

## 加强针的种类是否可以和之前接种的COVID-19疫苗不同？

根据年龄不同，您选择的加强针种类可以和COVID-19疫苗初始系列不同。

您如果对加强针的选择有疑问，您需要向专业医生或本地社区组织（CBO）进行咨询。



## 加强针有哪些副作用？

加强针的副作用和疫苗初始系列类似，包括发热，头痛，乏力和接种部位疼痛。以上各种情况完全属正常现象，极少发生严重的副作用。

## 如果我的免疫功能较弱，我是否需要再在附加针之后再接种一次加强针？

是的，如果您的免疫系统较弱或严重缺失，建议您在接种完附加针后5个月再补充一剂加强针。



## 如果我的免疫功能较弱，我是否需要再在附加针之后再接种一次加强针？

是的，COVID-19疫苗和加强针对孕妇也同样安全有效。接种加强针能预防您和胎儿感染COVID-19，以及在孕期感染COVID-19带来的严重风险。

## 在哪里可以接种加强针？是免费的吗？

您可以在您的医疗卫生提供者，药房，卫生部等处接种加强针。拨打1-800-232-0233，或访问 [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov)，寻找在您附近的接种场所。另外，加强针和初始系列疫苗一样，无论移民身分如何，对所有人一律免费。如需帮助，请联系您的本地社区组织。

## 我能同时接种流感疫苗和COVID-19加强针吗？

是的，根据[CDC](https://www.cdc.gov) 及其免疫实践咨询委员会的建议，可以同时接种流感疫苗和COVID-19疫苗。