


شات تقویت کننده FAQ Booster shot کواید 19

پرسش ها و پاسخ های متداول در مورد شات تقویت کننده
کواید 19



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

**WE
CAN
DO
THIS**
COVID-19
Community Corps

**ASIA
ICHC**
INTERNATIONAL COMMUNITY
HEALTH CENTER

کدام اشخاص می توانند که تزریق تقویت کننده ویا بوستر شات بگیرند؟

اشخاص 12 سال و یا بالاتر از آن:

- واکسن پی فایزر تشویق میشود تا پنج ماه پس از دریافت دومین واکسن در سری اولیه خود، واکسن تقویتی دریافت کند.
- واکسن مدیرنا تشویق میشود تا پنج ماه پس از دریافت دومین واکسن در سری اولیه خود، واکسن تقویتی دریافت کند
- واکسن جانسون- جانسون تشویق میشود تا بعد از دو ماه دوره واکسن نخست شان زرق تقویت کننده را بگیرند. اشخاص که عفونت های پیشرو را تجربه کردند و مبتلا به این مرض بودند (نتیجه معاینات شان مثبت بوده بعد از تکمیل مکمل واکسین) تشویق میشوند که باید تزریق تقویت کننده را بگیرند چون که مقاومت ایمنی واکسن طولانی تر از مصونیت طبیعی است.

چرا تزریق تقویت کننده ویا بوستر شات ضروری میباشد؟




واکسن ها تاثیر گذار و موثر میباشد و از عفونت جلوگیری میکنند. چانس رفتن به شفاخانه و مبتلا شده به بیماری کرونا و مرگ را پایین می آورد.
شات تقویت کننده ضروری می باشد چون موثریت واکسن به مرور زمان پایین میرود.
این طبیعی است که در سایر واکسن معمولی مشاهده شده است مانند، واکسن تیتانوس سیاه سرفه و دیفتی میباشد. تزریقهای تقویتی حفاظت شما را در طول زمان بالا میبرد.

معنی سری اولیه چیست؟ آیا فرق بین دوز DOSE اضافی و دوز DOSE تقویت‌کننده چیست؟

"سری اولیه" اشاره به دو زرق پی‌فایزر Pfizer، مدیرنا Moderna و یا DOSE نخست واکسن جانسن، جانسن را می‌گویند که بخاطر جلوگیری از ویروس میباشد. "دوز اضافی" و یا Additional dose پی‌فایزر و یا مدیرنا را اشخاص که نسبتاً نقص ایمنی شدید دارند باید 28 روز بعد از سری اولیه بگیرند چون که بدن آنها به زرق دیگر ضرورت دارد تا بتواند مصونیت قبلی اش همچون اشخاص بدن نقص ایمنی می باشد بدست بیاورند. "زرق تقویت‌کننده" بعد از گرفتن سری اولیه به اشخاص داده میشود تا که بتوانند مصونیت آنها را به مروز زمان تقویت کند.

آیا میتوانیم تزریق تقویت‌کننده متفاوت از واکسن کواید نوزده بگیریم؟

نظر به سن و سال خود شما میتوانید که یک تقویت‌کننده متفاوت از واکسن کواید 19 خود انتخاب کنید. اگر در مورد واکسن تقویت‌کننده سوالی دارید باید با متخصص مراقبت های بهداشتی یا سازمان محلی (CBO) خود صحبت کنید.



عوارض جانبی زرق تقویت چیست؟

عوارض جانبی زرق تقویت‌کننده همانند سری اولیه می باشد، مانند تب، سردردی دل بدی و درد در جای که واکسن تزریق شده است، همه این بسیار عادی میباشند. عوارض جانبی جدی در آن بسیار کم دیده میشود

اگر من نقص ایمنی داشته باشم آیا ضرور است که زرق تقویت کننده را بعد از شات اضافی و یا ادیشنل شات بگیرم؟
بلی ، اگر شما نقص ایمنی شدید دارید شما را تشویق میکنیم که شش ماه بعد از زرق اضافی و یا ادیشنل شات بوستر شات و یا زرق تقویت کنند بگیرید.

آیا من میتوانم در زمان بارداری زرق تقویت کننده را بگیرم؟

بلی ، واکسن کواید 19 و شات های تقویت کننده و یا بوستر شات برای خانمهای باردار مصون و موثر میباشد. شما باید شما تشویق میشوید برای گرفتن زرق تقویت کنند بگیرید تا که شما و طفل شما از خطرات مبتلا شدن به مرض کواید 19 محفوظ باشید. از مبتلا شدن به کواید 19 دوران بارداری ممکن است به خطرات جدی منجر شود.



کجا میتوانم شات تقویت کننده و یا بوستر شات را بگیرم؟ آیا شات تقویت کننده و یا بوستر شات رایگان است؟

شما میتوانید شات تقویت کننده خود را در مکان های ارائه مراقبت های بهداشتی ، دواخانه های و اداره بهداشتی و یا هم میتوانید که به شماره 1-800-232-0233 و یا به سایت [Vaccine.gov](https://www.vaccine.gov) مراجعه کنید. علاوه بر آن همانند سری اولیه زرق تقویت کننده نیز بر همه رایگان میباشد ، بدون در نظر داشت وضعیت مهاجرتی شما. اگر به رهنمای ضرورت دارید با CBO محلی خویش صحبت کنید.

آیا من میتوانم که واکسن (فلو) سرماخوردگی و زرق تقویت کننده را همزمان بگیرم؟

بلی ، واکسن سرماخوردگی و کواید 19 را میتوانید همزمان بگیرید. همانطور که توسط CDC و یا کمیته مشورتی در زمینه شیوه های ایمن سازی نیز توصیه شده است.

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS.