

## مجوز استفاده اضطراری پی فایزر برای اطفال 5-11 سال.

تاریخ 10/29/2021 واکسن پی فایزر و بیونتک مجوز استفاده اضطراری از طرف سازمان غذا و دارو برای واکسن کواید 19 به اطفال 5-11 سال را بدست آورد و مدیر مراکز کنترل بیماری استفاده از آن را تایید کرده است.

در حال که این یک نقطه عطف مهم در کار واکسن ما است ، بیشتر از 25% والدین حاضر به گرفتن واکسن برای اطفال 5-11 سال شان هستند. تا آنجا در 15 نومبر بیشتر از 3.64 میلیون، اطفال پایین تر از سن 12 سال دوز نخست واکسن کواید 19 شان را گرفته اند. (منبع سی دی سی).

بعد از آزمایش های دقیق اف دی ای اجازه گرفتن واکسن پی فایزر بیونتک را برای اطفال 5-11 سال داده است و سی دی سی نیز استفاده آنرا تایید کرده است. بر اساس نتایج قاطع اف دی ای و سی دی سی اعلام کردند که واکسن مصون و موثر می باشد.

تا به امروز پس از صد ها میلیون دوز که به بزرگان و نوجوانان داده شده است ، واکسن پی فایزر عوارض جانبی مداوم نداشته است. ما میدانیم که این واکسن برای بزرگان مصون و موثر می باشد. بدون تردد گفته می توانیم که برای اطفال نیز موثر خواهد بود. (منبع سی دی سی).

## سوالات مکرر:

### چگونه و در کجا میتوانم طفل خود را واکسن کنم؟

واکسن در نزد متخصصان اطفال ، کلینیک های فامیلی ، اداره بهداشتی محلی ، مراکز بهداشتی جامعه، دوا خانه ها، مرکز بهداشتی مکتب ها ، در بعضی جای ها ممکن در کلینیک بهداشتی روستایی موجود باشد. همچنان مرکز بهداشتی هاوایی بومی و مرکز بهداشتی فدرال واجد شرایط. بعضی از مکاتب نیز ممکن واکسن برای فامیل ها داشته باشند. ما از همه تقاضا داریم که صبر کنند. ارایه دهندگان سیستمی را برای مدیریت هجوم علاقه راه اندازی میکنند. شما با ارایه دهندگان، پزشکی معمولی خود مشورت کنید ، و یا Vaccines.gov مراجعه کنید تا بدانید که باید به بخاطر واکسن کجا بروید. به سایت

### فرق بین واکسن اطفال و بزرگسالان چیست؟

واکسن کودکان 5-11 سال یک سوم دوز تزریق شده به نوجوانان و بزرگسالان میباشد، این دوز با در نظر داشت تعادل ایمنی موثر و مفید سیستم ایمنی اطفال سن 5-11 سال انتخاب شده است. واکسن با در نظر داشت وزن نه بلکه با در نظر به سیستم ایمنی تهیه شده است. (منبع سی دی سی)

## آیا واکسن کواید 19 بر باروری کودکان تاثر میگذارد؟

نخیر ، **کدام مدرک** وجود ندارد که مشکلات باروری یک از عوارض جانبی واکسن کواید 19 است. دانشگاه زنان و زایمان امریکایی و جامعه پزشکی باروری آمریکا به شدت توصیه کرده است که همه باید واکسن کواید 19 بگیرند. ([ACOG](#))

## آیا فرزند من میتواند همزمان با سایر واکسن ها واکسن کواید 19 را دریافت کند؟

بلی ، طبق سی سی دی سی و آکادمی اطفال امریکا، کودکان میتوانند که واکسن سرماخوردگی و ایمن سازی معمول کودکان را همزمان با واکسن کواید 19 میتوانند دریافت کنند. ([CDC](#))

## تاثیر طولانی مدت واکسن بر کودکان چیست؟ چطور ما مطمئن باشیم که واکسن مصون میباشد؟

همانند واکسن های دیگر ، این واکسن نیز عوارض جانبی کوتاه مدت دارد مانند تب و درد بازو. مدت یک سال که ما به صدها میلیون بزرگسالان واکسن دادیم شاهد عوارض جانبی جدی را نبودیم و ما انتظار نداریم که عوارض جانبی طولانی مدت را در اطفال مشاهده کنیم علاوه از مبتلا شده به کواید 19 جلوگیری میکند. ([CDC](#))

## آیا مزایای واکسیناسیون فرزندم بیشتر از خطر آن است؟

بلی، انجمن اطفال آمریکا واکسن کواید 19 را برای اطفال پنج سال و اطفال که واکنش شدید آلرژیک به واکسن ندارند توصیه میکند. در موارد بسیار نادر التهاب قلب که به عنوان میکاردیت شناخته میشود ، یک هیت مستقل از پزشکان و دانشمندان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند خطر مرتبط به واکسن کواید 19 بسیار کمتر از خطر ناشی از قرار داد کواید 19 در کودکان است. آنها همچنین توافق کردند که خطر کلی قرار داد کواید 19 بیشتر از عوارض جانبی احتمالی واکسن است. ([CDC](#))

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS

برای معلومات هر بیشتر میتوانید به [apiahf.org](#) و [madetosave.org](#) مراجعه کنید و عزیزان تان را از کرونا نجات دهید.