


简体中文
2022年6月

关注最新信息

新冠疫苗加强针 指南



对最新的新冠疫苗加强针指南有疑问吗？查看此资源，以便了解最新信息，保护自己、家人和社区。

新冠疫苗加强针有助于增加保护力，预防严重疾病和死亡。

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

资料来源：美国疾病预防控制中心 (CDC)



新冠疫苗加强针指南

1 剂加强针适用人群

- 已完成初始疫苗序列接种的 5 岁及以上个体

2 剂加强针适用人群

- 已完成初始疫苗序列接种的 50 岁及以上个体
- 已接受强生疫苗的初始疫苗和加强针接种的 18 岁及以上个体
- 中度或重度免疫功能低下且已完成初始疫苗序列接种的 12 岁及以上个体




简体中文
2022年6月

关注最新信息

5-11 岁 的儿童

5-11 岁的儿童应在完成辉瑞-BioNTech 初始疫苗序列接种 **5 个月** 后接受加强针注射。如果您的孩子免疫功能低下，他们应该在初始疫苗序列接种 **3 个月** 后接受加强针注射。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM




简体中文
2022年6月

关注最新信息

12岁及以上个体

所有12岁及以上的个体应在完成辉瑞或莫德纳初始疫苗序列接种5个月后接受加强针注射，或在接受强生疫苗2个月后接受加强针注射。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



简体中文
2022年6月

关注最新信息

12岁及以上的免疫功能低下个体

12岁及以上的中度或重度免疫功能低下个体应在接受第一剂加强针注射 4 个月后接受第二剂加强针注射。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



简体中文
2022年6月

关注最新信息

50岁及以上个体

50岁及以上的个体应在接受第一剂加强针注射5个月后接受第二剂加强针注射。



APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



简体中文
2022年6月

关注最新信息

接受过强生疫苗的 18岁及以上个体

18岁及以上的个体，如果在4个月前接种了强生疫苗的初始疫苗和加强针，则第二剂加强针可接种 mRNA 新冠疫苗。

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



关注最新信息

简体中文
2022年6月

新型冠状病毒肺炎资源

如需预约新冠疫苗接种，请访 [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov)，致电 [1-800-232-0233](tel:1-800-232-0233)，或将您的邮政编码通过短信发送至 [438829](tel:438829)。您也可以联系当地医生、社区组织、有资质的联邦健康中心、农村健康诊所或夏威夷本土健康中心，寻求更多帮助。

请访问 [apiahf.org](https://www.apiahf.org) 了解有关新型冠状病毒肺炎的更多信息，或向我们发送邮件，地址为 covid@apiahf.org。

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

本出版物由美国卫生和公众服务部 (HHS) 疾病预防控制中心的合作协议 CDC-RFA-IP21-2106 资助发布。
其内容完全由作者负责，不一定代表 CDC/HHS 的官方观点。