



കോവിഡ്-19 ബുസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ



ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ്-19 ബുസ്റ്റർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയും പരിരക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്നതിന് ഈ റിസോഴ്സ് കാണുക.

രോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാനും ഗുരുതര രോഗബാധയും മരണവും തടയാനും കോവിഡ്-19 ബുസ്റ്ററുകൾ സഹായിക്കുന്നു.

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM



കോവിഡ്-19 ബുസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഒരു ബുസ്റ്ററിന് യോഗ്യതയുണ്ട്

2 ബുസ്റ്ററുകൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്

- പ്രാഥമിക സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ,
5 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും
പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ


- പ്രാഥമിക സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ,
50 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും
പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ
- J&J വാക്സിന്റെ പ്രാഥമിക വാക്സിനം
ബുസ്റ്റർ ഡോസും ലഭിച്ച, 18 വയസ്സും
അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ
- പ്രാഥമിക സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ,
മിതമായോ ഗുരുതരമായോ
രോഗപ്രതിരോധശേഷിയിൽ അപര്യാപ്
തതയുള്ള 12 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും
പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ



അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കൂ

5 മുതൽ 11 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ



5 മുതൽ 11 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ, ഫൈസർ ബയോഎൻടെക് വാക്സിന്റെ പ്രാഥമിക സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കി **5 മാസം** കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ബൂസ്റ്റർ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ്ക്ക് രോഗപ്രതിരോധശേഷിയിൽ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ തങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക സീരീസ് എടുത്ത് **3 മാസം** കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബൂസ്റ്റർ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം.



അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കൂ

12 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ

12 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും തങ്ങളുടെ ഫൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണ വാക്സിന്റെ പ്രാഥമിക സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കി **5 മാസം** കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ & ജോൺസൺ (J&J) വാക്സിൻ എടുത്ത് **2 മാസം** കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബൂസ്റ്റർ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം.



അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കൂ

രോഗപ്രതിരോധശേഷിയിൽ അപര്യാപ്തതയുള്ള 12 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ

മിതമായോ ഗുരുതരമായോ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയിൽ അപര്യാപ്തതയുള്ള, 12 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ബുസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത് **4 മാസം** കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ബുസ്റ്റർ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം.



അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കൂ

50 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ

50 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ
ആദ്യ ബുസ്റ്റർ കുത്തിവയ്പ് എടുത്ത് **5 മാസം** കഴിഞ്ഞ്
രണ്ടാമത്തെ ബുസ്റ്റർ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം.



അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കൂ

J&J വാക്സിൻ എടുത്ത 18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ

J&J വാക്സിന്റെ പ്രാഥമിക വാക്സിനും ബൂസ്റ്റർ ഡോസും എടുത്ത് **4 മാസം** കഴിഞ്ഞ, 18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു mRNA കോവിഡ്-19 വാക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കാം.



അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കൂ

Malayalam
ജൂൺ 2022

കോവിഡ്-19 റിസോഴ്സുകൾ

ഒരു കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ അപോയിൻമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന്, [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) സന്ദർശിക്കുകയോ, [1-800-232-0233](tel:18002320233) എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ, [438829](tel:438829) എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ZIP കോഡ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. അധിക സഹായത്തിനായി, നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഫിസിഷ്യനെയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി-അഡിഷ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനെയോ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് യോഗ്യതയുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെയോ റൂറൽ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കിനെയോ തദ്ദേശീയ ഹവായിയൻ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെയോ ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

കോവിഡ്-19 സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് apiahf.org സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ covid@apiahf.org എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക.

APIAHF
ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നത് യു.എസ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആന്റ് ഹ്യൂമൻ സർവീസസിന്റെ (HHS) രോഗ നിയന്ത്രണ, പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണ ഉടമ്പടി CDC-RFA-IP21-2106 പ്രകാരമാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ്, കൂടാതെ CDC/HHS-ന്റെ ഔദ്യോഗിക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല.